



MATIÈRE ACTIVE CONCENTRÉE 50PPM



Nom du produit : **BRODITOP[®] GEL**
 Type de produit : **TP 14-Rodenticide**

Formulation : **Appât rodenticide sous forme de gel, prêt à l'emploi**

1 coup de pistolet = 10g

N° A.M.M.: **FR-2018-0004**

Composition : **50 mg/kg de Brodifacoum (n° CAS 56073-10-0)**

Contre	SUPPORT	RÉFÉRENCE	GENCODE	Conditionnement	Groupage	Palette
Rats Souris	GEL en cartouche	TFAFR043	8005831100815	cartouche de 300g	18 cartouches	70 cartons
PRODUIT RÉSERVÉ À USAGE PROFESSIONNEL						

BRODITOP GEL est un appât rodenticide prêt à l'emploi sous forme de gel conditionné en tube de 300 g, pour le contrôle des souris domestiques et des rats – rat brun et rat noir. Le produit est utilisé sur les organismes cibles du stade juvénile au stade adulte. BRODITOP GEL est à base de brodifacoum, puissante substance active anticoagulante de deuxième génération à prise unique. Le mode d'action de la substance active permet de ne pas éveiller la méfiance des autres rongeurs de la colonie, qui continuent à consommer le produit. BRODITOP GEL contient un mélange de composants d'origine alimentaire, appétant pour les espèces cibles mentionnées ci-dessus. Sa formulation a été étudiée pour maximiser sa stabilité à une large gamme de températures, ses caractéristiques physiques et chimiques ne changent pas et rendent son utilisation polyvalente. Grâce à ces caractéristiques, le gel est indiqué pour être utilisé à l'intérieur et autour des bâtiments, dans les environnements civils, industriels et ruraux. En particulier, dans les zones rurales et zootechniques, il est recommandé de placer les points d'appât dans des zones surélevées, sur les lieux de passage fréquentés par les rongeurs. BRODITOP GEL contient un agent amérisant (Benzoate de dénatonium) pour aider à prévenir la consommation par l'homme.

les postes d'appâtage sont intacts et de retirer les cadavres de rongeurs.

Contre les rats (*Rattus norvegicus* et *Rattus rattus*) - Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur autour des bâtiments :

- Faible infestation: jusqu'à 100 grammes de produit par point d'appât espacés de 10 mètres

- Forte infestation: jusqu'à 100 grammes de produit par point d'appât espacés de 5 mètres

Les postes d'appâtage doivent être inspectés 5 à 7 jours après le début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage sont intacts et de retirer les cadavres de rongeurs.

INSTRUCTIONS DE PREMIERS SOINS ET MESURES D'URGENCE POUR PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT

- Lorsque des points d'appât sont placés à proximité de systèmes d'évacuation des eaux, s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau. Ce produit contient une substance anticoagulante. En cas d'ingestion, parmi les symptômes pouvant apparaître, parfois avec un certain retard, figurent des saignements de nez et des saignements gingivaux. Dans certains cas graves, des contusions et la présence de sang dans les selles ou les urines peuvent être observées.

Antidote: Administration de vitamine K1 par du personnel médical/vétérinaire uniquement.

En cas:

- d'exposition cutanée, nettoyer la peau à l'eau puis à l'eau savonneuse;
- d'exposition oculaire, rincer les yeux avec une solution de rinçage oculaire ou de l'eau en gardant les paupières ouvertes au moins 10 minutes;
- d'exposition orale, rincer soigneusement la bouche avec de l'eau.

Ne jamais rien administrer par voie orale à une personne inconsciente. Ne pas provoquer de vomissement. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin et présentez-lui le contenant du produit ou l'étiquette.

En cas d'incident, contacter un centre antipoison. N° ORFILA (INRS): 01 45 42 59 59

Contactez un vétérinaire en cas d'ingestion par un animal domestique. Chaque poste d'appâtage doit être muni d'une étiquette mentionnant les informations suivantes: «Ne pas déplacer ni ouvrir; contient un rodenticide; BRODITOP GEL, N° AMM: FR-2018-0004; substance active: Brodifacoum; en cas d'incident, contactez un centre antipoison. N° ORFILA (INRS) 01 45 42 59 59 ». Dangereux pour la faune.

INSTRUCTIONS POUR L'ÉLIMINATION DU PRODUIT ET DE SON EMBALLAGE : Une fois le traitement terminé, éliminer l'appât qui n'a pas été mangé ainsi que l'emballage, dans un circuit de collecte approprié.

CONDITIONS DE STOCKAGE : Conserver le produit dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant bien fermé et à l'abri de toute exposition directe au soleil. Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux

domestiques et animaux d'élevage.

DURÉE DE CONSERVATION : 24 mois à compter de sa date de fabrication.

AUTRES INFORMATIONS : En raison de leur mode d'action retardé, les rodenticides anticoagulants agissent entre 4 et 10 jours après consommation de l'appât. Les rongeurs peuvent être porteurs de maladies. Ne pas toucher les cadavres de rongeurs à mains nues; porter des gants ou utiliser des instruments tels que des pinces pour les éliminer.

Ce produit contient un agent amérisant et un colorant.

Classement : DANGER



H360D Peut nuire au fœtus.

H373 Risque présumé d'effets graves sur les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

P201 Se procurer les instructions avant utilisation.

P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

P260 Ne pas respirer les poussières.

P280 Porter des gants de protection.

P308 + P313 En cas d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

P314 Consulter un médecin en cas de malaise.

P405 Garder sous clef.

P501 Éliminer le contenu/récipient dans les circuits de collecte appropriés, selon la réglementation en vigueur.

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

TP 14. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Respectez les précautions d'emploi.



INSTRUCTIONS D'EMPLOI Catégorie d'utilisateur : Professionnels

Méthode d'application : Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés ou dans des points d'appâts couverts et protégés.

Insérer le tube à l'intérieur du pistolet à silicone. Coupez un trou dans la pointe conique du tube et insérez la buse. Coupez la buse au-dessus du filetage en veillant à ne pas l'endommager, ensuite distribuez le produit. Une fois terminé, visser le capuchon de protection et desserrer la pression du pistolet à silicone afin d'éviter la perte du produit. Conserver le tube à l'envers. Conserver à l'abri de la chaleur.

Dose et fréquence d'application :

Contre les souris domestique (*Mus musculus*) - Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur autour des bâtiments :

- Faible infestation: jusqu'à 50 grammes de produit par point d'appât espacés de 5 mètres

- Forte infestation: jusqu'à 50 grammes de produit par point d'appât espacés de 2 mètres

Les postes d'appâtage doivent être inspectés tous les 2 à 3 jours après le début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si